

Gydytojo chirurgo koloproktologo konsultacija

PASIRUOŠIMAS REKTOSKOPIJAI:

Prieš tyrimą į tiesiąją žarną reikia susileisti 4 mikroklizmas (Mikrolax). Dvi vakare, kitas dvi - 2 val. iki tyrimo.

* **Su siuntimu** – pacientams, turintiems siuntimą ir apdraustiems PSD.

* **Reguliari** – pacientams, neturintiems siuntimo arba nedraustiems PSD.

<i>Kodas</i>	<i>Paslaugos pavadinimas</i>	<i>Kaina (Eur)</i>	
		<i>Su siuntimu*</i>	<i>Reguliari*</i>
830	Gydytojo koloproktologo pirminė konsultacija ir gydymo paskyrimas.	30	60
831	Gydytojo koloproktologo pakartotinė konsultacija ir gydymo paskyrimas (dėl tos pačios ligos 30 d. laikotarpiu).	30	30
832	Gydytojo koloproktologo konsultacija, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: transrektalinis endoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstripacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar), drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, polipektomija.	50	90
833	Gydytojo koloproktologo pakartotinė konsultacija, kai atliekama 1 iš šių intervencijų: transrektalinis endoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstripacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar), drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, polipektomija.	50	50
838	Gydytojo koloproktologo konsultacija, kai atliekamos 2 iš šių intervencijų: transrektalinis endoskopinis tyrimas, chirurginė intervencija (ekscizija ir (ar) ekstripacija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar), drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija), biopsija, polipektomija.	70	140
834	Vaistai ir vienkartinės medicinos priemonės	nuo 15	nuo 15
835	Anorektalinis vienkanalis kateteris su anoskopu	30	30
910	Echoskopijos nuotrauka, 1 vnt.	5	5

